Soluzione preliminare del problema 9

Problema 9) Hinshelwood, meccanismo delle reazioni ad alta T

Per comodità, invece di scrivere CH₃CHO scriverò [A].

a) La prima è una reazione di iniziazione; la 2, 3, 4, 5 sono reazioni di propagazione, mentre l'ultima è ovviamente di terminazione.

b) L'approssimazione dello stato stazionario afferma che la velocità di variazione complessiva della specie in esame è nulla.

$$d[\text{HCO}^*] / dt = K_1[A] - K_4[\text{HCO}^*] = 0, \quad \text{da cui } [\text{HCO}^*] = K_1/K_4 * [A]$$

$$d[\text{H}^*] / dt = K_4[\text{HCO}^*] - K_5[\text{H}^*][A] = 0, \quad \text{e sfruttando il risultato ottenuto sopra } [\text{H}^*] = K_1/K_5$$

$$d[\text{CH}_3^*] / dt = K_1[A] - K_2[\text{CH}_3^*][A] + K_3[\text{CH}_3\text{CO}^*] - 2 K_6[\text{CH}_3^*]^2 = 0$$

$$d[\text{CH}_3\text{CO}^*] / dt = K_2[\text{CH}_3^*][A] - K_3[\text{CH}_3\text{CO}^*] + K_5[\text{H}^*][A] = 0$$

Sommando queste due equazioni e isolando otteniamo

$$[\text{CH}_3^*] = K_1^{0.5} [A]^{0.5} / K_6^{0.5}$$

Sostituendo l'espressione sopra trovata in una delle due ultime equazioni, dopo semplici passaggi algebrici, otteniamo la formula per l'ultimo radicale:

$$[\text{CH}_3\text{CO}^*] = (K_2 K_1^{0.5}) / (K_6^{0.5} K_3) [A]^{1.5} + (K_1/K_3) [A]$$

Come si potrà notare, le concentrazioni di tutti i radicali sono state espresse solo in termini delle costanti e dell'etanale, A. Tutto ciò è propedeutico all'esercizio successivo.

c) $d[A] / dt = -K_1[A] - K_2[\text{CH}_3^*][A] - K_5[\text{H}^*][A]$, sostituendo ai radicali le espressioni sopra ottenute abbiamo che $d[A] / dt = -2 K_1[A] - K_2[A]^{1.5} K_1^{0.5}/K_6^{0.5}$

$$d[\text{CH}_4] / dt = K_2[\text{CH}_3^*][A] = K_2[A]^{1.5} K_1^{0.5}/K_6^{0.5}$$

$$d[\text{C}_2\text{H}_6] / dt = K_6[\text{CH}_3^*]^2 = K_1[A]$$

$$d[\text{H}_2] / dt = K_5[\text{H}^*][A] = K_1[A]$$

$$d[\text{CO}] / dt = K_3[\text{CH}_3\text{CO}^*] + K_4[\text{HCO}^*] = 2 K_1[A] + K_2[A]^{1.5} K_1^{0.5}/K_6^{0.5}$$

d) Osservando le relazioni delle velocità scritte nell'es. sopra, emergono effettivamente due possibili dissociazioni per l'etanale (adesso lo scrivo in maniera completa):

Per la prima, la velocità della reazione corrisponde alla velocità di formazione del metano ossia $K_2[A]^{1.5} K_1^{0.5}/K_6^{0.5}$, quindi l'ordine rispetto ad A per la prima equazione è 1.5.

Per la seconda, la velocità della reazione corrisponde alla velocità di formazione dell'idrogeno (o dell'etano, infatti non a caso sono uguali), ossia $K_1[A]$, quindi l'ordine rispetto ad A per la seconda equazione è 1.

Considerando che una definizione generale dell'energia di attivazione è la seguente:

$$E_a = RT^2 d \ln K / dT \quad (\text{per riprova basta integrare la precedente equazione in forma indefinita,}$$

ottenendo $\ln K = \text{costante} - E_a / RT$, e ponendo la costante = $\ln A$, otteniamo $\ln K = \ln A - E_a/RT$, che non è altro che l'equazione di Arrhenius scritta in forma logaritmica.)

Considerando per es, che per la prima equazione la $K = K_2 K_1^{0.5}/K_6^{0.5}$

$$\text{Otteniamo quindi } E_a = RT^2 d(\ln K_2 K_1^{0.5}/K_6^{0.5}) / dT = RT^2 (d \ln K_2/dT + 0.5 d \ln K_1/dT - 0.5 d \ln$$

$$K_6/dT) = E_{a2} + 0.5E_{a1} - 0.5E_{a6} = 187$$

Analogamente per la seconda reazione l'energia di attivazione varrà semplicemente $E_{a1} = 358$.

Soluzione proposta da

Luca Zucchini

medaglia di bronzo alle olimpiadi IChO 2008